

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十八 明 周王朱橚 撰

諸癰門

足厥陰肝癰

附論

夫經謂足厥陰肝癰在經則令人腰疼小腹滿小便不利如癰狀非癰也數便意欲恐懼氣不足腹中悵悵在藏則令人色蒼蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脉循陰氣客之則小腹滿小便不利也肝為

將軍之官智謀出焉故病則恐懼不足也蒼蒼者肝之色也宜察其經絡臟腑而治之治肝瘧顏色蒼蒼顫掉氣喘積年不瘥鼈甲丸等方主之

方

鼈甲丸

一名烏梅丸  
出千金方

治肝瘧色蒼蒼顫掉氣喘久不瘥

者如死或久熱勞微動如瘧

鼈甲

去裙襴  
醋浸久

蜀漆葉

烏梅

取肉  
炒

常山

剉

知母

焙  
各

一分甘草

微炒

細辛

去葉

苦參

萎蕤

各半  
兩

香豉

一各  
微炒

石

膏

半兩  
研

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸未發前米飲

下臨發再服

烏梅丸

出聖  
惠方

治肝癰久不瘥

烏梅

取肉酒  
浸微炒

常山

剉各  
一兩

知母

犀角

鎔  
屑

丹砂

別  
研龍

骨升麻

豉

桂

甘草

桃仁

湯浸  
去皮

雙仁

麴

炒過各  
半兩

虎頭骨

醋  
炙鼈甲

去裙襴  
炙黃一兩

右為極細末再同研勻煉蜜和搜成劑於淨石臼中

搗至二三百下杵然後作丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒吞下晚食前再服

蜀漆丸

出聖惠方

治肝瘧顏色蒼蒼顫掉氣喘變成勞瘧積

年不瘥

蜀漆

烏梅

取肉微炒

常山

剉各半兩

鼈甲

去裙襴醋炙

石膏

研各

一兩合

甘草

剉微炒

知母

苦參

剉

麝香

細研

桃仁

浸湯

去皮尖雙仁麪過各半兩

右為末同研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大

空心溫酒下二十九晚食前再服粥飲下亦得

知母湯

出聖惠方

治肝癰上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌

肉消瘦不下食

知母

地骨皮

升麻

各一兩

鼈甲

同前

犀角

鎔屑

麥冬

人參

柴胡

去苗

石膏

各一兩

甘草

生剉半兩

虎頭骨

酥炙

過一兩半

右麤搗篩每服四錢水一盞入香豉五十粒煎至六

分去滓溫服不計時候

木香犀角丸 治肝瘧

木香

犀角

鎔

羚羊角

鎔 各一兩半

升麻

甘草

炙 各二兩

元參

堅者

猪苓

去皮 滓 炙

檳榔

各二兩

鼈甲

酥炙

豉

炒 五兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大溫酒或米飲下三十丸分服體熱即去甘草檳榔加大黃五兩

烏梅飲

治肝瘧小便不利如瘕

烏梅

取肉

山梔子

各半兩

知母

一兩

芍藥

木通

剉 生地

黃

升麻

各二分

右咬咀如麻豆每服五錢水盞半煎至一盞去滓下

朴硝一錢食後未發前溫服分二服

大柴胡湯

出旅舍  
備要方

治瘧病寒熱嘔逆脉弦小緊間日頻

且發作無時及傷寒熱結在裏腹滿譫言煩渴大小  
便澀并痰氣寒熱方

柴胡

去苗  
八兩

芍藥

黃芩

各三  
兩

半夏

二兩五  
湯七次

枳殼實

炒去穢  
半兩

大黃

二兩

右為散每服五錢水二盞半薑五片棗三箇同煎至

兩盞去滓帶熱頓服

半夏湯

山衛生家寶方

治瘧疾及暑毒消痰逐飲

半夏

湯泡七次

白茯苓

青皮

去白

陳皮

去白

枳殼

去炒

穰桔

梗

炒各一兩

右為剉散每服三錢水一盞半生薑十片煎至七分

溫服

手少陰心瘧

附論

夫心瘧者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚

熱刺手少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故煩心其欲得清水者以心火內熱故也其反寒多不甚熱者內熱而外寒故也治宜通心經利邪熱則愈

方

甘草湯

出千金方

治心熱為瘧不止或止後熱不渴乍來乍

去令人煩心甚欲飲水反寒多不甚熱者

甘草

一兩

蜀漆

三兩

常山

鼈甲

各四兩

石膏

五兩

香豉

一合

梔子

烏梅

各三枚

竹葉

切升二

右吹咀以水九升煮取三升分三服

柴胡栝蒌根湯

出衛生寶鑑方

治瘧而發渴者

方見本門發渴類

大黃丸

出聖惠方

治心瘧發歇不定

川大黃

半兩炙剉肉炒

常山

一分四十粒

砒霜

細研一分

鼈甲

酥炙麝香

一錢研細

硃砂

一分研細

右為末入後三味研令勻醋煮麴糊和丸如梧桐子

大每服食前用桃仁冷醋湯下二丸忌食熱物

熊膽丸

出聖惠方

治心瘧

砒霜

研半

丹砂

研

麝香

研

雄黃

研

熊膽

各二分

右以熊膽和丸如菉豆大發日空心冷水下二丸臨發時再服一丸皆以冷飲厭或當日便止或大作乃差如欲吐即以煖水下之當吐出痰涎

麝香丸

出聖忠方

治心瘡

砒霜

一分

麝香

一分

金箔

三十片

黃丹

一分炒

硃砂

一分

兩

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女右中指上節用緋帛裹繫一丸發前以冷醋湯下一丸

忌食熱物

常山丸

出聖惠方

治心疼瘧

常山

別搗治一兩

桃仁

取陳者去雙仁炒和皮搗細一兩

鉛丹

八錢研

豉

一合炒令可碎乾淨手揅勻別搗

右研為末煉蜜和再搗千杵丸梧桐子大每服十五丸雞鳴空心酒下欲發時再服十五丸其日不得梳洗發過方可飲食一方桃仁湯下

硃砂丸

出聖惠方

治心瘧

光明砂

半兩  
研細

常山

一兩

杏仁

十枚湯浸去皮  
共雙仁炒微黃

右為末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未發  
前粥湯飲下十五丸欲發時再服

足太陰脾瘧

附論

夫足太陰之經脾之脉也脾經之瘧令人不樂好太息  
不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中痛熱  
則腸中鳴鳴已汗出故謂之太陰瘧又名脾瘧

方

木香丸 治脾瘕

木香

附子

炮去  
皮臍

大黃

剉炒

厚朴

去粗皮  
薑汁炙

人參

各一  
兩

芍藥

桂

去粗  
皮

荆三稜

煨

獨活

去蘆  
頭

乾薑

炮

羌活

去  
蘆 芎藭

甘草

炙各  
半兩

陳皮

湯去  
白炒

檳榔

剉各  
二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸未發溫水下日三一方以前藥十五味為末磁器盛之密封臨服加牽牛末二分同藥末一兩同研勻煉蜜為丸如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口

吐清水白沫醋心瘕癖氣塊男子腎臟風毒攻刺四  
體及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脇堅滿不  
消卧時橘皮湯下三十丸以利為度此後每夜二十  
丸女人血利下血痛刺積年血塊胃口逆手足心煩  
熱不思飲食薑湯下三十丸取利每美夜更服二十  
丸小兒五歲以上疳氣腸胃氣喘空心溫湯下五七  
丸小者減丸數服凡胸腹飽悶不消脾泄不止臨卧  
溫酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣說覺頭痛背

臍拘緊便宜服之快利為度若常服此藥可以不染  
瘴疾凡瘴氣皆因脾胃實熱所致常以涼藥解膈上  
壅熱并以此藥通利稱善此丸本治嵐瘴及溫瘧大  
效李敦裕以此方刻石於大庾嶺得効者不可勝數  
昔人嘗有擁兵過漳者軍人皆感瘧用此治之應時  
患愈江南時值歲發溫瘧以此藥服之其効如神皆  
以得快利為度又記凡久瘧服藥訖乃灸氣海百壯  
又灸中脘三十壯尤善又加肉苳蔻六枚去根止瀉

方用

青蒿湯

治脾瘧寒熱善嘔多汗

治鬼瘧內藥鼻中生效方

出聖患方

天靈蓋

狢獠頭骨

梔黃

細研

阿魏

乳香

藜蘆

去蘆頭

黃丹

各七分

麝香

一錢細研

右為末研令勻以醋煮麪糊和丸如豇豆大欲發前  
先以綿裹一丸用內鼻中瘧

麝香丸

出聖患方

治鬼瘧發動無時節寒熱不定

麝香

研細

硃砂

研細各三分

砒霜

研細

恒山

剉

鼈甲

塗酥

黃去裙

虎頭骨

酥炙

微黃

甘草

生用

川大黃

生用

各半兩

右為末研入前三味令勻五月五日以粽子和丸如

梧桐子大臨欲發時以溫酒下三丸得吐瀉為度

輔正丸

出聖濟總錄

治鬼瘧

天靈蓋

酥炙

砒霜

研

丹砂

研

麝香

研

虎頭骨

酒炙

鉛丹

研  
猢猻頭骨

酒炙

菜豆粉

各半兩

右為細末用粟米飯和丸如梧桐子大每服一丸未

發前新汲水下或以手握之有孕婦不得食小兒只

可半丸以菉豆湯下其藥以五月五日合面東搗之

虎睛丸

出聖濟  
總錄

治鬼瘡

虎睛

一對酒  
浸炙

丹砂

研

麝香

研

雄黃

研

砒霜

研

安息

香

入胡桃  
仁和研

阿魏

研

天靈蓋

酥炙各  
三分

右為末用燒餅和丸如小豆大每服用一丸未發前

男左女右手把之一丸可療十人

丹雄丸

出聖濟  
總錄

治鬼瘡

丹砂

炒一錢

膩粉

三錢

巴豆

七粒去皮心膜去油

乳香

研

麝香

研

雄黃

研

砒霜

研各半錢

右為末水浸炊餅心為丸如梧桐子大每服一九發

前新汲水下

萬安丸

出聖濟總錄

治鬼瘧

虎頭骨

酒炙三兩

藜蘆

六兩

雄黃

研

鬼臼

天雄

炮裂去皮臍

蕪荑

炒

皂莢

酥炙去皮子各一兩

右除雄黃外為末入研者雄黃和勻煉蜜丸如彈子

大令患者頭上戴一九立瘡若除伏屍於房四角燒  
四粒疫氣於牀前燒一粒

甘草 烏梅

各等分

右咬咀每服半兩水盞半薑五片棗二枚同煎至七  
分不拘時候寒多者加乾薑附子熱甚者止加柴胡  
瘴瘧加檳榔所加者各等分一方加人參一方熱多  
者加石膏

生熟飲子

一名交加飲子  
出十便良方

治脾寒脾經受冷時發寒熱

及升降陰陽治瘧疾辟瘴氣

方見本門  
久瘧類

半夏散

出御藥  
院方

治足少陰瘧嘔吐

半夏

湯洗去滑為末生薑  
汁和并暴乾再為末

右同研勻每服二錢溫酒一盞調下未發日頓服

知母丸

治瘧疾脾寒

知母

貝母

草薢仁

甘草

鼈甲

酥炙  
九炙

常山

用淡豆豉一合米醋一升  
同煎乾下用豉細切常山

右等分為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九

當發日入麝香酒送下仍用後藥助氣

除桂建中湯

黃耆

兩半

白芍藥

兩一

甘草

二錢半

右為末每服三錢水盞半生薑棗子入錫糖少許再

煎化空心服

常山丸

出經効濟世方

治脾瘧由熱氣內傷不洩故脾瘧令人

病腸中熱痛外寒腸中轉鳴汗出治一切瘧疾

常山

一兩剉

甘草

半兩剉炒微赤

知母

一兩

豉

一合麝香

一分研

甲

一兩 塗醋炙令黃色先去裙襴

右為末與麝香末和勻煉蜜為丸如桐子大於未發前溫下二十九臨發再服已試極驗

人參散 治脾瘧

人參

甘草

炙各一分

陳皮

湯浸去白焙半兩

烏梅

五枚去核焙

草

苴菟

七枚去皮

右剉為末每服五錢濕紙裹定熟水盞半生薑棗大拍碎棗二枚擘破磁器內煎一盞去滓未發前溫服

檳榔湯 治脾瘧寒熱

檳榔

剉

青橘皮

湯浸去白焙

前胡

白朮

菝葜

各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分未發前去滓溫服

橘皮散 治脾瘧

陳橘皮

湯浸去白焙

常山

乾漆

炒出煙

桂

去粗皮各三分

牡蠣

燒赤一分

右為末散每服三錢未發前溫酒下三服必瘥

硫黃丸 治脾瘧無間遠近

阿魏

研

安息香

入胡桃穰研

萊菔子

各三錢炒

蕪荑仁

微為末炒

分三

右為細末煉蜜丸如菰豆大每服二十九丸未發前溫水下得吐為瘥後作少蒜齏下餽飫食之仍以白芥子用紗囊盛男左女右繫於臂

常山丸 治脾熱為瘧或不渴熱氣內傷不瀉令人病寒腹中痛腸中鳴汗出

常山

三兩

甘草

半兩

知母

鼈甲

各一兩

右為末蜜丸如桐子大未發前溫服十丸臨發前時

服一服正發一服

辰砂丸

出宣明論

治一切脾胃虛弱熱邪毒者

信砒

甘草

各一錢

硃砂

二錢

大豆

四十粒

右為末滴水和丸分作四十丸服發日日欲出時桃

仁湯下忌熱物

厚朴湯 治脾癰不思食

厚朴

去粗皮生薑汁炙三兩

半夏

為末薑汁作焙乾汁作一兩

陳橘皮

洗

去白焙

二兩

右麗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破

煎至七分去滓空心日午臨卧各一服

能截脾寒五月五日脩合

用大蒜不以多少搗爛次入礬紅拌勻為圓眼大每服一九大蒜湯送下

薑橘散

一名十棗湯出傳信通用方

治脾及諸瘧

右真橘皮不拘多少去白細切曝微乾以生薑自然  
汁浸過陳皮一指許銀器內重湯煮乾焙為末每服  
三錢用隔年青水棗十枚水一盞煎至半盞以此藥  
通口服以棗下之於發日先一時辰服之不過兩服  
而止後再一服不拘老少孕婦皆可用服

草菓平胃散

出危氏方

治脾虛作瘧不問寒熱先後飲食不

進

以生料平胃散四兩加入草菓大腹皮檳榔青皮各

二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分空心多服取効

半夏散

治脾瘧

方見本門足陰腎瘧類

草菓飲

治脾寒

草菓

常山

檳榔

甘草

少許黑豆各等分

右咬咀水二盞煎一盞去滓露一宿空心未發前一日溫服

歟火丹

治脾寒

淡豉

二信兩

錢雄黃

五錢

硃砂

三錢

右為末用蒸餅量多少搗和為丸如梧桐子大每服五十丸隔發一時用冷水送下忌熱物濕麪發毒等物三五日

吳茱萸湯

出楊子建護命方

治脾熱寒瘧非時發作肌肉黃瘦

食減腸泄腸痛大腑不調

吳茱萸

煉洗焙乾

芎藭

鼈甲

去裙襴酥炙

防風

人參

蒼朮

米泔浸一宿切焙

藿香葉

柴胡

去苗肉苁蓉

去殼甘

草各等分

右劉散每服三錢水一盞生薑二片煎七分去滓未發前空心溫服

柴胡厚朴湯 治脾寒

柴胡 厚朴 青皮 陳皮 常山 草菓 烏

梅 甘草 縮砂 檳榔各等分

右咀咀每服三錢水一碗煎八分露一宿五更冷服正發一服過後又一服

良薑丸

出朱氏  
集驗方

醒脾治瘧

良薑

二兩

右末猪膽丸梧桐子大紫蘇湯下二十丸

手太陰肺瘧

附論

夫肺瘧者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有  
所見刺手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通  
故瘧邪入肺內動於心則為寒熱善驚之候也

方

人參丸 治肺癰心寒熱善驚如有所見

人參

鼈甲

同桃仁

去皮尖雙

恒山

甘草

炙肉

茯苓

酒浸切焙

升麻

各三分

桂

去粗皮

烏梅肉

炒

龍齒

各研

一兩杏仁

去皮尖雙

丹砂

研一分

阿魏

研一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心

米飲下未發時併二服

麥門冬湯

治肺癰及補心氣

麥門冬

去心一兩半

升麻

知母

剉

甘草

炙

鼈甲

醋炙

去裙

柴胡去苗 前胡去蘆 桃仁去皮去雙仁研炒 枳殼去穰麵炒

梔子

去皮

蘆根剉 烏梅肉

炒各半兩

人參三分

右麤搗篩每服二錢半入桃柳枝各五寸姜三片煎八分去滓入石膏末一錢更煎沸未發前一二服

烏梅丸

治肺癰

烏梅肉

炒

恒山

鼈甲

去裙襴醋炙

人參

知母

焙

肉

茯苓

酒浸切焙

桃仁

去皮尖雙仁各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或

米飲下未發三服

丹砂丸 治肺癰心神驚悸

丹砂別對阿魏

醋化去沙石麝香  
麝和作餅炙

各一分

鉛丹

研一兩

右為細末取五月五日午時粽子三十七與藥同研  
於北斗下露一宿丸如桐子大未發前熱水下丸  
將一丸緋帛裹一丸安耳內男左女右

二丹丸 治肺癰心神驚悸

丹砂

別研鉛丹

別研甘草

炙剉各半兩

當歸

半兩恒山

三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸食前溫水下  
未發時再服熱候饑即以葱豉粥與之

杏仁丸 治肺癰

杏仁

四十枚湯浸去皮雙仁炒黃色

恒山

三分

丹砂

別研半兩

甘草

生剉一分

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服十九丸發熱米飲下

日再服之

秫米湯

一名恒山湯出千金方

治肺癰心寒甚即發熱熱即驚如

有所見

恒山

一兩半

秫米

一兩

甘草

炙對半兩

右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓未發前溫服發再服之

黃連湯 治肺癰心虛

黃連

去鬚一兩半

當歸

切焙一兩

乾薑

炮半兩

右麤篩每服三錢水一盞煎至七分去滓臨發時服

足少陰腎癰

附論

內經謂足少陰腎癰在經則令人嘔吐多寒熱熱多寒

少欲閉戶偏而處其病難已在臟則令人洒洒然腰脊疼宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰益腎脉入脉中脉環胃口故使人嘔陰虛則傷氣偏故熱多若夫洒淅腰脊痛大便難目眴小足寒持以藏氣機關不利故為此證也

方

烏梅丸

出聖惠方

治腎瘧腰脾痛手足寒食少無力

烏梅肉

一兩微炒

桂心

一兩

甘草

一兩炙

虎頭骨

二兩塗酥炙令

黃人參

一兩去蘆頭

香豉

一合炒乾

恒山

二兩剉

桃仁

半兩去皮尖湯

浸雙仁麴炒微黃

附子

半兩炮製去皮臍

川升麻

一兩剉

鼈甲

醋炙黃色去裙

麝香

一分細研

肉苁蓉

一兩酒浸去皮尖乾一宿

右為末入麝香勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每以食前以粥飲下二十丸漸至三十丸

烏梅丸

出聖惠方

治腎瘡令人洒洒然腰脊痛大便難目眇

手足寒及瘡久不瘥者

烏梅肉

炒一兩半

恒山

剉三分

豉

一合炒

虎頭骨

酥炙半兩

麝香

錢研

一桃仁

皮一兩湯浸去  
尖細研

附子

泡去皮  
半兩

肉蓯蓉

酒浸  
切焙

半兩

知母

切焙  
一分

桂

一分去  
粗皮

右搗研拌煉蜜和如桐子大每服空腹米飲下二十

丸未發服一方無知母

蓯蓉丸

治腎虛

肉蓯蓉

酒浸焙  
半兩

烏梅肉

炒半  
兩

恒山

劉三  
分

豉

炒三  
分

升

麻桃仁

湯浸去皮尖  
炒研三分

桂

去粗皮  
半兩

甘草

炙半  
兩

右搗研和勻煉蜜和丸如梧桐子大每未發日空腹

溫酒下二十丸米飲亦得未發時更服三十丸

人參湯 治足少陰瘧嘔吐寒熱

人參

一件去蘆頭

恒山

剉各半兩

甘草

生剉三分

燈心

五十莖

茶末

陳橘皮

湯浸去白焙各一分

右麤搗篩每服五錢水一盞煎七分去滓入酒半盞相和未發前頓服以吐為度未吐再服

恒山湯

出千金方

治腎熱發為瘧令人淒然腰脊痛宛轉大

便難目眴眴然身掉不定手足寒

恒山

三兩 烏梅 枚

三七 竹葉

切一

香豉

八合 葱白

一握

右㕮咀以水九升煮取三升分三服至發令盡一方

用桃仁無竹葉

天雄丸

出聖惠方

治腎虛無問新久發作無時神効

天雄

泡裂去皮臍半兩一方作生用

鉛丹

研三分

人參

三分

右搗研和勻煉蜜丸如梧子大每服五丸未發日空

心米飲下日三五服

半夏散 治足少陰嘔吐

半夏

湯洗去滑生薑汁製焙

乾薑

炮各半兩

綠礬

研一錢

右搗研勻每服半錢未發日以醋湯調下

足少陽膽瘧

附論

夫少陽瘧之狀內經謂令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘧邪外中其氣不守故心常惕惕然盛故熱有風故汗出

方

升麻湯 治足少陽瘡身體解倦見人心惕惕然熱多

汗出

恒山

一兩半

升麻

鼈甲

醋炙去裙襴

淡竹葉

各一兩

犀角

屑

麥門冬

焙去心

知母

切各三兩

甘草

炙半兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓

空心日午溫服

黃連丸 治足少陽瘡清膿

黃連

去鬚一兩

甘草

炙剉半兩

龍膽

去苗

鉛霜

研

定粉

研

人中

白馬牙硝各三分 研一兩

右為末用猪膽汁和丸如桐子大每服二十九用枳  
杷葉拭去毛煎湯下三服

犀角湯 治足少陽瘧解倦熱多汗出

犀角鎔甘草炙各一兩麥門冬去心焙升麻 知母 鼈

甲醋炙去裙襴各一兩半石膏碎研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓  
於未發前溫服

蘆根湯

治足少陽瘧熱多汗出及溫瘧初壯日熱後

寒戰骨節酸痛口渴

生蘆根

剉三兩

麥門冬

去心焙

升麻

葛根

各一兩半

梔子

仁

一兩

石膏

研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入淡竹葉二

七片煎一盞去滓溫服早晚食前

柴胡湯

治足少陽瘧熱多汗出

柴胡

去苗

秦艽

去苗土

麥門冬

去心焙

蘆根

淡竹葉

各一

兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水盞半煎至一盞去滓  
入青蒿自然汁半合再沸未發前五更初溫服

犀角丸 治少陽身體解倦或寒熱心惕惕然汗出

犀角屑分一恒山一蜀漆葉半豉炒一

右為末煉蜜丸如桐子大每服十丸未發前米飲下

足太陽膀胱瘡

附論

夫太陽瘡之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒

而後熱煇煇喝喝然熱止汗出難已刺郄中出血蓋膀胱經下抵腰中上顛絡腦故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒後熱止汗出難已以真氣勝邪故也

方

柴胡湯 治足太陽瘧寒熱

柴胡

去苗

恒山

剉

龍甲

去裙襴醋炙黃

知母

焙

青蒿

乾者

甘草

炙剉枳殼

去穰麵炒

桂

去粗皮

各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸

細切同煎至七分去滓空心服發前再服

酒煎飲

治足太陽瘡腰痛頭重寒熱互作

方見本門  
久瘡類

柴胡桂薑湯

治足太陽瘡腰痛頭重寒多熱少

方見本門

諸瘡類

牡蠣湯

治足太陽瘡

方見本門  
諸瘡類

麻黃黃芩湯

出濟生  
拔萃方

治太陽證夜發晝瘥

麻黃

去根節

黃芩

去心

甘草

炙各半兩

桂

二錢五分

每咬咀一服一兩水三盞服

足陽明胃瘧

附論

夫足陽明胃瘧在經則令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出汗出見日光月光火氣快然當刺足陽明跗上在胃則令人陽明旦病善饑而不能食食則支滿腹當大刺足陽明太陰橫脈出血蓋胃圍冲氣為水穀之海邪氣客之則冲氣不和故善饑不能食食則支滿腹大傳於經者有寒熱陽不勝於陰故善喜日月光及火氣也

方

順氣湯

治足陽明胃瘧支滿腹大

厚朴

去粗皮  
薑汁製

陽橘皮

湯去皮  
白焙

白朮

半夏

湯浸七  
次焙各

一兩乾薑

炮

柴胡

去苗

甘草

炙各  
半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘煎七

分去滓溫服無時

清脾湯

出醫方  
集成

治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作時寒

慄鼓振頤頤領中外皆寒腰脊俱痛寒戰已內外皆熱

頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔因食傷  
脾停滯痰瘧或先熱後寒先寒後熱寒多熱少或寒  
熱相併或但熱不寒或但寒不熱或隔日發一日一  
發或三五日一發者悉皆主之

厚朴

四兩薑汁製炒

烏梅

去仁

半夏

浸去滑

青皮

良薑

各二兩

草菓

去皮一兩

甘草

炙半兩

右為剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎七分  
去滓未發前併三服忌生冷油膩時菓此藥服溫脾

化痰治胸膈痞悶心腹脹滿意醋吞酸自可常服

紅圓子

出直指方

治胃瘕食積氣滯腹脹

荆三稜

水浸軟切片

蓬莪朮

煨

青皮

去白

陳皮

去白各五兩

胡

椒

乾薑

炮各三兩

右為末米醋煮米粉糊和丸如梧子大礬紅為衣每

服五十丸淡薑湯下或二陳湯四獸飲亦可下

正氣湯

出衛生方

治胃瘕不食肢滿腹脹時作寒熱

藿香葉

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去粗皮薑汁炙

半夏

為末生薑

汁作餅  
曝乾

甘草

炙各  
一兩

右粗搗每服三錢水一盞生薑三片煎七分未發併

兩服

枳殼湯

治胃瘧心腹脹滿不食

枳殼

去穰麴  
炒三兩

厚朴

去粗皮  
薑汁炙

人參

白朮

白茯苓

去黑皮

各二兩

右搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大切煎一

盞去滓溫服

藜蘆丸

出千金方

治五臟并有瘡候則六腑無獨胃腑有之

胃腑瘡者令但病也善饑而不能食食而支滿腹大

藜蘆

恒山

皂莢

牛膝

各一兩

巴豆

三十枚去皮心研紙

裹壓去油

右先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜和丸如小豆大  
旦服一九發時一九一日勿飽食一方無恒山牛膝

溫水下

紅圓子

出醫方集成

專治食瘡

蓬朮

荊三稜

醋炙各二兩

胡椒

二兩

青皮

炒香二兩

阿魏

一分

化醋

右為末別用陳蒼米末同阿魏醋煮糊為丸如桐子大每服五十丸加至百丸用薑湯吞下或因食生菓成瘡用麝香吞下一方炒土硃為衣以老米飲下古方雖有鼈甲煎等不時服不見効抑亦藥料難備

厚朴湯

治足陽明胃瘡寒熱汗出食則支滿腹大

原朴

去粗皮生薑汁炙二兩

白朮

陳皮

浸去白焙各一兩

桂

去粗皮

甘草

各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二箇擘煎至七分去滓食前溫服

人參蜀椒湯 治胃瘡腹滿

人參

半兩

蜀椒

去目及閉口炒出汗一分

阿魏

麴和餅炙三分

乾薑

炮一兩

右搗如麻豆每服三錢水一盞煎七分未發前去滓

溫服

恒山橘皮散 治胃瘡脹滿不食

方見本門  
山瘴瘧類

蒜薑酒 治胃瘧饑不能食

獨窠蒜一生薑一分

右研碎以酒半升調去滓未發時旋旋服之

阿魏酒 治胃瘧

方見本門足少陰腎瘧類

寒瘧

附論

夫寒瘧之狀內經所謂後熱先寒病以時作是也蓋伏暑汗出腠理開後因遇憂氣淒滄之水寒其氣藏於腠理皮胃之中秋傷於風則病成矣其證先起於毫毛伸

欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭疼飲冷是也

方

五積散

出直指方

治感寒發瘡初作以此解散

蒼朮

炒三兩

北梗

一兩

麻黃

去根節

枳殼

製

陳皮

各六錢

乾

薑

厚朴

製各四兩

川芎

當歸

白芍藥

白芷

甘草

茯苓

半夏

製

官桂

各三錢

右剉散每服三錢水一盞半葱白三寸薑三片煎空

心服

恒山丸

出聖惠方

治寒瘡陽虛陰盛內外俱寒四肢顫掉

恒山

半兩

野狸頭骨

一分

虎頭骨

一分

狢獠頭骨

一分

天靈

益菴豆末

三分

梔黃

一分

安息香

一分

雄黃

一分

砒

霜乳香

一分

阿魏

一分

白芥子

一分

朱砂

一分

細研

右藥并生用擣羅為末軟飯和搗三二百杵丸如梧

桐子大調合時勿令孝子女人見須五月五日午時

合為妙如緩急即不擇日辰合未發時以絳囊盛於

中指上繫一九男左女右三日不住以熱水服一九  
娠婦小兒不可服忌食熱物

硃砂丸

出聖方

治寒熱瘧但寒不熱四肢鼓顫不止

硃砂

一分細研

麝香

半分細研

砒霜

一分細研

恒山

一分劉

虎頭骨

一分塗

胡獠頭骨

一分炙黃

虎睛

一對酒浸微炙

乳香

一分安息

香

一分阿魏

一分巴豆

三枚去皮心反油

雄黃

半分細研

右為末端午日脩合用醋煮麪糊和搗一二百杵丸

如豌豆大用緋帛裹男左女右手把一九如痰瘧即

以醋湯下一丸每服把者一九可治三人

吳茱萸湯

出續易簡方

治寒瘧先寒後熱頭疼不可忍熱極

即汗出煩渴相次便醒宜服此藥

吳茱萸

湯浸焙炒一兩

羌活

去蘆頭半兩

甘草

炙

乾薑

炮

半夏

湯洗七次焙

芎藭

細辛

去苗葉

麻黃

去根節

高良薑

藜蘆

本

去苗土

桂

去麋皮各一分

右為細末每服三錢以水一盞煎至七分臨發時寒和滓空心熱服若寒了及熱更不用服須只用初發

寒時服也寒未定更進一盞喫藥後不可卧須更病減八分若是太歲遇六壬己亥之年當瘧未發常服暖脾藥一方有牽牛炒半兩

養胃湯加桂

出直指方

治感寒發多熱少或但寒不熱頭痛

腰心胸滿呃逆身體疼痛慄慄振寒面色青白不進飲食脉來弦遲

厚朴

製蒼朮

炒二兩

半夏

製二兩

人參

茯苓

草菓

藿香

各半兩

橘紅

三分

甘草

炙一兩

右劉散每服三錢水一盞半薑五片烏梅半箇煎八分去滓溫服不拘時候多寒者加附子煎一方用棗不用烏梅

雄黃丸

出聖惠方

治寒瘧不止

雄黃

一分 硫黃

一分 硃砂

一分 麝香

半 阿魏

半 桂心

一分 末

乾薑

一分 巴豆

一分 去皮心用水二升煮水盡壓去油研如麩

右和研勻醋煮麩糊和丸如梧桐子大未發前綿裹一丸安耳中及男左女右緋帛繫一粒於背上

草薹薹飲

出聖濟總錄

治寒瘧

草薹薹

去皮

高良薑

半

恒山

青皮

湯浸去白焙

陳皮

湯浸

去白焙各一分

生薑

半

黑豆

五十粒

淡竹葉

一握

右咬咀如麻豆用水三盞煎至一盞半去滓未發時

通口分溫二服

止氣散

出醫方大成

退寒瘧止胃寒進飲食

藿香

四兩

草薹

四兩

半夏

陳皮

厚朴

硝砂

甘

草

各一兩

右剉散生薑棗子煎溫服瘧疾後發日早服

安息香丸

出聖惠方

治寒瘧手足鼓顫心寒面青

硃砂

研細

虎頭骨

狢獠頭骨

砒霜

天靈蓋

阿魏

安息香

各半兩

右為末入硃砂研勻端午日午時用白團子和丸如豌豆大男左女右手把一九定後用緋帛袋盛繫於中指上若登溷即暫解去

檳榔湯

出聖濟總錄

治寒瘧

檳榔剉桂皮

去粗

恒山

陳皮

湯浸去白炒

甘草

炙剉各半分

右粗末每服三錢酒水各半盞煎一盞未發前去滓

溫服

神効方

出聖惠方

治寒瘧

硃砂

細研

白芥子

阿魏

各一錢

香墨

五錢

砒霜

一兩酸漿水一

碗于端午日未出時慢火熬如稀糊便入後藥

右為末以砒煎和為丸如黍米大每於未發前冷醋

湯下一丸至十九忌食熱物

分利順元散

出醫方集成

治體虛之人患瘡寒多不可服截

藥者

川烏

附子

各一兩

南星

一兩

木香

五錢別剉臨時入

右除木香不見火外味各將一半去皮生用一半炮

熟合和咬咀每服四錢棗七枚薑十片水一盞煎七

分當發日前一日及當發日早晨連進二三服半生

半熟能解陰陽

白芥子丸

出聖惠方

治寒瘡手足鼓顫心寒面青

白芥子

硃砂

研細

阿魏

恒山

各等分

右為末入硃砂研勻醋煮麤糊和丸如桐子大每於

未發前醋湯下

阿魏丸

出聖惠方

治寒瘧

砒霜

硃砂

阿魏

麝香

各一分

右同研如粉麤糊和丸如小豆大每於未發前冷醋湯下一丸忌食熱物

豬膽膏

一名二薑散  
出朱氏集驗

治脾胃虛弱遂成瘧疾寒多熱少

大槩寒發於膽緒膽引入二薑於膽去寒燥脾胃二薑熟豬膽冷陰陽相制所以作効仍治秋深寒瘧

乾薑

炮一兩

良薑

切小塊麻油炒乾一兩一方各二兩半炒半生用不用麻油炒

右為末分作四服每服用豬膽瀝者取汁調成膏臨發時熱酒半調服或以膽汁和丸焙酒下四十五丸尤佳吳內翰攷致和丁酉居全椒歲雪大作施人所救愈者以百計張大享病甚欲致仕服之立愈

菓附湯

出醫方集成

治氣虛脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青

或單寒者或大便澀小便反多不下食

草菓仁

附子

炮去皮臍

右等分咬咀每服半兩水二鍾薑七片棗二枚煎七分去滓溫服不拘時

七棗湯

一名烏頭七棗湯

治瘧及久瘧但寒并脾寒發瘧重輕

用川烏一隻熱多寒少者湯泡七次寒多熱少者火炮七次切去皮焙乾分二服水一碗半棗七枚薑七片葱七根煎至二鍾臨發前先喫棗子次攄去滓溫

服或將附子一枚炮七次鹽水浸七次分二服露一宿名冷附湯大槩附子一枚溫脾逐寒川烏溫脾去風附子性重滯川烏性輕疎若寒痰當日用附子是風用川烏雖然烏頭性熱以七次炮熟散其熱性服之必効經驗方陳氏云林侍郎謙之常以此藥授人余家服之屢有効

一名烏頭  
七棗湯

生熟附子湯 治分利陰陽正發寒熱治瘧疾欲作胸痞痰嘔頭眩顫掉用附子二隻一生去皮一鹽湯浸

去皮炮各取二錢沉香木香水各一盞薑七片棗七枚煎一盞當發日空心服一宜比下黑錫丹可回元氣墜痰

鼈甲散 治寒瘡勞瘡

取鼈甲不拘多少醋炙黃為末每服二錢溫酒調下空心食前臨卧時各一服治勞瘡塗醋炙服之

鼈甲湯 治瘡寒多

鼈甲

湯浸刮冷  
淨醋炙

常山

柴胡

桂

去皮各  
一兩

白朮

二兩

牡蠣

半兩火煨赤

右為散末每服五錢水二鍾煎一鍾去滓溫服

溫脾飲 治寒瘧兼脾久濕上焦噎塞不通止渴進飲

食

真陳橘皮

五箇去皮

烏梅

十箇

人參

一分

大棗子

二十箇

甘草

五寸 草薺子

七箇

生薑

五片

右件洗淨分作五服紙裏以鹽少許煨香熟去紙水  
一碗煎一盞去滓溫服空心日午

蒜丹 寒瘡手足鼓顫心寒面青宜服此方

獨顆蒜

一枚半黃丹

兩

右件藥相和五月五日午時同搗一千杵丸如黑豆  
大未發時以茶下二丸

烏頭丸 先寒後熱者名之為寒瘡故寒而不熱面色  
黑者名為厥瘡先寒後熱熱少寒多面黃腹痛名之  
為脾瘡此三候並宜服此不再丹大賈耘老方東坡  
累試早晨一服晚便不發病稍瘥莫服湯

草烏頭

削去皮

用服湯泡一十四度以盞蓋之薄切焙乾為末稀糊和丸如桐子大棗三箇薑十片葱三根煎湯服五十  
五仍喫棗令盡如人行五里別加再服用此二十年  
只一服瘥烏頭蛀損瘦薄者不堪使

蒜九子 治寒多熱少

良薑 厚朴 附子

各三銖

右為末大蒜九於發日絕早煎烏梅湯勻作三服早

食前令服盡

溫瘧

附論

夫溫瘧與寒瘧安分溫瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑骨髓鑠肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧先寒而後熱者此由

夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之小寒  
寒迫之藏於腠理皮胃之中秋傷於風則病成矣夫寒  
者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒  
而後熱病以時作名曰寒瘧先傷於風而後傷於寒故  
先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見  
熱者溫瘧也

方

麻黃湯 治溫瘧初發身熱頭疼不可忍臨醒時即寒

慄戰動不定逡巡便醒宜服此方須是先熱後寒方  
啖此藥

麻黃

去根節煎  
掠去沫焙

羌活

去蘆頭

丹皮

去心

獨活

去蘆頭

梔子

去

柴胡

去苗

桔梗

剉炒

升麻

荊芥穗

大黃

剉炒

半夏

洗去  
滑焙

木香

知母

焙

黃芩

去黑心  
各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎取七  
分去滓未發時服一方有牽牛無木香為細末同煎  
臨發壯熱時和滓啖須是用初發熱時服仍是食後

喫發了已寒即更不要喫待第二服發熱時喫也名  
麻黃羌活散

常山丸 療溫瘧

常山 烏梅肉

熱

豉

天靈蓋

炒各六分

硃砂

蜀漆

大黃 知母

各四分

右搗篩蜜和丸如桐子大空心以溫酒下二十九至  
三十九日三服並未發前服不吐利忌生葱菜生血  
等物恐成骨蒸

常山湯 療溫瘧潮羸瘦欲成骨蒸

常山

三兩

車前葉

一握

甘草

二兩

獼猴骨

三兩

天靈蓋

三兩

天靈蓋

一兩燒  
作灰末

烏梅肉

二兩

驢糞

汁三合

右切以水六升煮五味取三升去滓下糞汁天靈蓋  
分三服微吐不利忌生葱生菜海藻菰菜麵粘食等  
物一方無驢糞汁

知母鼈甲湯 療溫瘧壯熱不能食

知母

鼈甲

炙

地骨皮

各三兩

竹葉

切一升

石膏

四兩

石膏

常山

二兩

右切以水七升煮取二升半去滓分三服忌蒜猪肉

莧菜生葱菜

麻黃飲子

治溫瘧煩悶

麻黃

一兩去根節

牡蠣粉

一兩

蜀漆

半兩

甘草

半兩

犀角屑

半兩

知母

半兩

右剉以水二大盞煎至一盞半去滓分為三服一日

服盡

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之火爭寒作則戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之證當實內治外恐久而傳入陰經也

桂枝

錢三

黃耆

知母

石膏

芍藥

各一兩

右為末每服七錢至半兩水煎如藥服之寒熱轉大者則知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝湯黃苓湯和之

松蘿湯

治溫瘧熱渴體痛

松蘿

半兩

烏梅肉

炒

梔子

去皮各半兩

升麻

三分

鼈甲

去裙襴醋

浸炙黃半兩

右搗粗篩每服三錢水一盞入茶末半錢煎至七分去滓未發前空心服

常山湯

治溫瘧

常山

剉半兩

鼈甲

去裙襴

浸炙黃

醋

甘草

生剉

炙各一兩

車前草

握一

切成片子三合

右麤搗篩每服三錢用漿水一盞浸藥一宿當發前一日以急火煎取七分去滓溫服

竹葉恒山湯 治溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如覺微寒或戰瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足煩熱乾嘔者瘧瘧先大寒後大熱者並主之尤宜乳下小兒亦可

淡竹葉

握

恒山

三兩切

小麥

一升

右用水五升漬一升明旦煮取二升溫分三服忌生

葱菜

恒山飲

出聖惠方

治溫瘧煩悶

恒山

半兩

甘草

半兩生用

冬瓜汁

一升用生者煎汁亦可

右剉以冬瓜汁浸宿早晨煎五六服去滓分為二服  
空心一服發前一服得吐瘥

治溫瘧方

用牡蠣和杜仲為末蜜丸每服三十九令人面光永  
不時氣溫水下

又方

取當歸煮汁飲

瘧發作無時

附論

夫微氣一日一夜大會于風府則賤理開開則邪入作  
病作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱其動作皆  
有早晏者若臟腑受邪內外夫守邪氣妄行所以休作  
無時也

方

硃砂丸

出聖惠方

治瘡寒熱發作不定體瘦不能食

硃砂

一分細研

麝香

一分細研

恒山

判

川升麻

苦參

判胡

獼猴腦

炙微黃

鼈甲

炙微黃

烏梅肉

微炒

柴胡

去苗

虎頭骨

醋塗炙黃

烏猫糞

燒

驢軸垢

木香

白朮

川大黃

判微炒

地骨皮

各半兩

巴豆

三分

去皮心熬黃別研如膏紙裏壓去油

右為末入研藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐

子大空心服溫水下四丸漸喫冷茶半碗良久吐痰

涎後便煎熱茶下二丸得吐利便効

虎頭骨散

出聖惠方

治瘧發作無時寒熱不定

虎頭骨

一兩塗酥炙黃

牡蠣

三分炒轉色

地骨皮

一兩

柴胡

一兩去苗

鼈甲

一兩塗酥炙去裙襴

知母

一兩

桂心

半兩

朴硝

一兩

右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓食前溫服

取下痰結為度

天靈蓋丸

出聖惠方

治瘧發作無時經久不瘥

天靈蓋

一兩

猢猻頭骨

一兩

硃砂

一分研細

雄黃

一分研細

麝香

一分研

菴豆粉

一分

砒霜

一分細研

虎頭骨

一兩

右為末入後五味研勻五月五日午時面南粽子尖  
和剉一剪刀還內過七遍丸如桐子大每服發前以  
青絹裹一丸繫男左女右臂上一丸可治七人第七  
人冷醋湯下

狐膽丸

出聖惠方

治瘧寒熱發作無時

砒霜

硃砂

各半兩

麝香

阿魏

各一分

狐膽

一枚

菴豆

粉

黃丹

各一分

右細研勻端午午時用粽子尖和丸如桐子大空心

及發前冷醋湯下二丸忌食熱物

桃奴丸

出聖惠方

治瘡發作無時節

猢猻頭骨

一兩生用

巴豆

一分去皮

砒霜

一分細研

野杖人花分

桃奴

向陽枝上半兩

斑蝥

一分炒微黃

右為末於端午日午時合以飯和丸如桐子大令患人手把一丸時時顧示仍男左女右於手背上緋帛繫一丸

虎睛丸

出聖惠方

治瘡發無時不定寒熱甚者

虎睛

一枚生搗細末

臘月猪血

少許硃砂

一分研

阿魏

一分細末

右研勻取端午日合粽子尖七枚和丸如黍粒大男

左女右綿裏一丸

砒霜丸

出聖惠方

治瘧發作無時者不定寒熱

砒霜

一兩

阿魏

一分

雄黃

三分

硃砂

一分並細研

右於端午日午時用糯米飯和丸菴荳大去發一時

辰綿裏三九男左女右塞耳中如惡發茶清下三九

當吐

靈砂丹

出聖惠方

治瘧發作無時經久不瘥

硃砂

半麝香

二錢

蝙蝠糞

五十豆

右研細用軟糯米飯和丸菴豆大未發時煖水下十

九

必効方

出聖惠方

治瘧無問新久發作無時

黃丹

四兩

麴塵

一兩

右取五月五日午時面東不語所搗獨蒜和丸雞頭  
實大男左女右於背上錦帛繫一九欲發時醋湯下

之

百瘡方

出聖惠方

治瘡無問新久發作無時

恒山

末一兩

葎草

一握去兩頭姓名勒夢秋冬月乾採亦得

右以淡漿水二盞浸藥於星月下上橫一刀經宿明  
早晨煎取一盞去滓空腹分二服如人行七八里再  
服當快吐痰午後漸食粥

又方

出聖惠方

用青皮一兩燒灰研細末發前溫酒調下一錢正發

時又服一錢

恒山湯

出肘後方

治瘧發作無常心下煩悶

恒山

二兩

甘草

炙一兩半

豉

五合綿裹

右切以水六升煎去滓取二升再服當快吐仍節飲

食忌海藻菰菜生葱菜

大効五丁飲子

出海上方

治瘧發作重者

白豆蔻

五箇每箇分作五塊

生薑

切如皂子大作二十五塊

京棗

五箇每箇分五

塊半夏

二十箇

甘草

五寸每寸分作五塊

右通作一百二十五塊於未發前一日至晚作一劑  
水二碗煎一碗去滓再燒兩糞滾作三服夜露中展  
至四鼓煖過熱吃一服再於曙色分時吃一服次至  
天曉吃些粥若稍空更吃一服便去睡極効

藥餽飢

出衛  
生方

良薑


吳茱萸

胡椒

各一  
分

右為細末猪脾一條剉作臠加五味炒之一半滾藥  
一半不滾並作餽飢有藥者以墨點之餘者吞下無

藥者嚼下亦一服効



普濟方卷一百九十八

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十九

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻緒

謄錄監生臣包文訓

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十九

明

周王朱橚撰

諸瘧門

山嵐瘴氣瘧

附論

夫傳言瘴者山川癘毒之氣又云江山霧氣多瘴凡以其氣鬱蒸而然也論家方論治瘴之法不一或謂其證與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有在膈可吐者又或以治瘧之法治之者今廣南山川地形瘴氣

所生之因及春夏之交瘴氣所起之時與夫人染瘴氣而治法悉著於篇庶可考焉且陽生於子盛於巳陰生於午盛於亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽而廣南位當巳午則陽之氣蘊積於此可知矣天不滿西北地不滿東南西北土地高厚東南土地卑下而廣南屬東南則土地之卑下可知矣以其卑下而陰陽二氣之所蘊積是以四圍之山崇高回環百川之水悉所歸赴及秋草木不凋瘁當冬蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不

散霧露之氣易以傷害此正岐伯所謂南方其地下水  
土弱霧露之所聚者也故瘴氣獨盛於廣南然瘴氣所  
起其名有二孟夏之時瘴名芳草而終於秋孟冬之時  
瘴名黃芒而終於辰四時皆能傷人而七八月之間山  
嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣尤甚故當是時瘴疾大作不論  
老壯或因饑飽過傷或因榮衛虛弱或衝煩霧或涉溪  
澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭疼體痛胃膈煩滿寒  
熱往來欬逆多痰全不思食發渴引飲或身黃腫脹眉

鬚脫落是皆毒癘鬱蒸所致夫生於陵者安於陵其土  
人宜無所受且日食檳榔蓋檳榔之為性破堅毒除蘊  
積故耳治法當以磁石下收其陰次以丹砂上正其陽  
陰陽氣正中滿自消然後以檳榔解其餘蘊 瘴與瘡  
分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率  
稱為瘴江北總號為瘡此由方言不同非是別有異病  
然南方溫毒此病尤甚原其所歸大畧有四一山溪毒  
氣二風溫痰飲三加之鬼癘四發以熱毒在此之中熱

毒最重故所用藥物須審病源患瘡瘡之後但是防瘡而發痢死不旋踵所以然者瘡體先虛虛不宜痢又瘡宜冷差痢宜溫斷斷痢則益瘡斷瘡則益痢大率如此不可不慎非直藥療亦須宜加將息取適若能一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘡最其妙也如不然先須斷痢然後療瘡瘡緩痢急故也仍變而作扶毒防之不得專醫其痢又服瘡藥皆在發前必須平旦空腹服藥之後勿洗手面漱口勿通外勿喫食勿勞力既過發時

久小進糜粥如此將療無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難療得瘡之後復癰癖亦有即發氣者死不嗽若熱渴者豉汁煖服取其得吐彌善水煮豉併犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如兩棗許大水和飲之并燒猪糞作黃龍湯亦善各可服三二升又搗大鼠絞汁與服大止熱毒瘡熱病服此俱効其鼠并頭皮五臟等全搗若汁少著少許水和絞亦不難服常用立驗也

方

大五補湯

出千金方

治時行後變成瘴癘

桂心

三十銖

遠志

桔梗

芎藭

各三兩

茯苓

乾地黄

芍藥

人參

白朮

當歸

黃耆

甘草

各三兩

竹葉

五兩

大棗

二十枚

生枸杞根

生薑

各一斤

半夏

麥門冬

各一斤

右㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

白微湯 治瘴癘經百日或一年者

白微

蜀漆葉

各半兩

常山

一兩知母

切焙半兩

大黃

生一兩

鼈甲

去裙襖醋炙黃三分

甘草

炙

苦參

升麻

半兩

石膏

碎三分

豉

一合蒜

獨顆者三枝切

淡竹葉

切三兩

龍膽

黃芩

去黑心各半兩

赤茯苓

去黑皮三分

右判如麻豆大每服三錢水一盞酒半盞同煎至一

盞去滓未發前溫一服發時一服仍以藥敷塗手面

良

白朮丸 治瘡瘡

白朮 丹砂研 麝香研 丁香 訶梨勒皮

安息香入胡桃研 檀香 萆撥 犀角鎔各半兩

薰陸香 蘇合香 龍腦研各一分 莎草根 石膏

木香各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九丸空腹并華水下老人小兒三丸仍用紗絹袋盛帶於臂辟鬼氣臘月合以新瓷器盛勿令泄氣

治山瘴瘧寒熱頭疼方

出聖惠方

恒山

半兩

烏梅肉

七枚

豉心

半兩

桃枝

一枝

柳枝

半兩

鼈甲

半兩塗醋炙令黃去裙襴

虎頭骨

半兩塗醋炙令黃

乾棗

三枚

青銅錢

一文雄鼠糞

二七枚

右細剉以酒一大盞半浸一宿明旦以重湯煮十餘沸去滓分為三服空心一服良久再服欲發時一服

麝香散 治瘴瘧

麝香

研一錢

鼈甲

去裙襴醋炙黃半兩

丹砂

研二分

甘草

炙半兩

大黃

炒三分

恒山

一兩

右為散每服三錢末發前溫酒調下臨發更一服

木香丸

出直指方

治瘴

檳榔

雞心者

陳橘皮

湯浸去白焙各二兩

木香

人參

附子

大者炮裂去皮臍

厚朴

去麤皮姜汁炙

桂

去麤皮

羌活

去蘆

荆三稜

炮

獨活

去蘆

乾薑

炮

甘草

炙

芎藭

天雄

剉炒

芍藥

各半兩

牽牛子

一斤搗取末四兩

肉苳蔻

大枚去殼

右為末瓷器盛密封臨服再用牽牛末二兩同研令

勻煉蜜為丸如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣  
臍下刺痛口吐清水白沫醋心痰癖氣塊男子腎臟  
風毒攻刺四肢及陽毒脚氣目昏頭痛嘔逆及兩脇  
堅滿臨卧橘皮湯下三十九丸以利為度婦女血痢下  
血刺痛積年血塊胃逆手足心煩熱不思飲食生姜  
湯下三十九丸取利小兒五歲以上疳氣腹脹氣喘燈  
心溫湯下五七丸小者減丸數服凡胸腹飽悶不消  
脾泄不止臨卧溫酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣

纔覺頭痛背膊拘急即早宜服之快利為度常服可以不染瘴疾凡瘴疾皆因脾胃實熱所致常以涼藥解膈上壅熱并以此藥通利彌善此藥本治嵐瘴及瘟瘧大効以快利為度

菖蒲散 治瘴氣久治不瘥者

菖蒲

乾者

白朮

剉炒

蒼朮

剉炒

梔子仁

荊芥穗

芎藭

各一兩

甘草

炙剉

乾薄荷

側柏

炒黃

消石

研

吳茱萸

湯浸洗焙乾各半兩

右為散用薄荷煎湯調下二錢如患熱疾水一盞入姜五片棗二枚擘破煎至五七分溫服

十補丸 治瘴氣虛弱面色萎黃不思飲食或困或醒心腹脹滿痞氣耳鳴補元氣

巴戟去心肉蓯蓉

酒浸切焙

白朮

米泔浸一宿切焙

五加皮

剉炒

石斛

去根各一兩

鹿茸

去毛酥炙半兩

人參

菟絲子

酒浸一宿別搗

栢子仁

研

菊花

各三兩

右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空

臨卧溫酒下鹽湯亦得

茵陳蒿丸

出聖惠方

治瘴疫時氣溫黃若嶺表行此藥常

帶隨身

茵陳蒿

四兩

大黃

五兩

豉

五合熬

恒山

梔子仁

熬

芒硝

研

杏仁

去皮尖

雙仁

炒研各三分

鼈甲

去裙襴醋

浸炙二兩

巴豆

半兩去皮心熬別研去油

右為末煉蜜丸如梧桐子大初得時氣三日以粥飲

旦服五丸至半時許或吐或利或汗為効如不吐利

不汗更服一二九即以熱飲投老小加減凡黃病痰  
癖時氣傷寒瘧痢小兒熱欲發癇服之瘥治瘴氣尤  
妙一方無大黃有麻仁

露宿湯

恒山

炒一兩

秦艽

去苗土

梔子仁

柴胡

青蒿子

檳榔

生剉半兩

甘草

炙剉各半兩

桂

去麁皮一分

右麁搗篩每服三錢水三盞入烏梅二枚黑豆二十  
粒煎至一盞去滓露一宿五更初再溫服其滓再入

水二盞煎至一鍾去滓當夜臨卧時服

却毒散

出十便良方

治山嵐瘴氣有黑霧起處急服

麻黃

去根節

蜀椒

去目并合口炒出汗各一兩

烏頭

炒去皮臍

白朮

各半兩

防風

去叉一兩

桔梗

炒

桂

去麤皮各半兩

乾姜

炒一分

右為散每服一盞溫酒調下每日食前常服一云嵐

者嶺南青草黃芒瘴狀如嶺北傷寒也南地暖故大

陰時草木不黃而落伏蟄不閉而藏其虫因煖而生

則仲夏有青黃瘴孟冬有黃芒瘴彼人失醫多成疸

疾即為難治嶺南之人得之亦如傷寒狀頭疼一日  
三日以上在於皮膚前汗可愈五日以上結於臟腑  
身重而節痛當下之得愈即不可先下下之亦為難  
療其或不解則春秋作瘡痢而肌膚黃瘦可服此方

烏藥湯

治瘴氣

烏梅

剉焙  
一斤

半夏

半斤生薑絞汁  
浸二宿焙乾

桂

去粗皮  
一兩

馬鞭草

焙半  
斤

荊芥穗

陳橘皮

去白焙乾  
各四兩

甘草

四兩

右搗篩每服二錢水一盞入生薑五片煎七分去滓

不拘時候溫服

丹砂丸 治山嵐氣安心臟

丹砂

研半兩

阿魏

研一分米泔浸令軟  
研以醋為糊用

白朮

人參

白茯苓

去皮

當歸

切焙各半兩

右搗研五味為末用阿魏醋煮麵糊丸如梧桐子大  
如當發空心溫酒嚼下七丸遇患者空心桃仁湯嚼  
下十丸檳榔湯亦得

秦芫湯 治山嵐瘴氣如瘡

秦艽

去苗土

柴胡

去苗各半兩

恒山

二分

烏梅肉

三枚

糯米

一撮

右剉如麻豆水三盞煎至一盞半去滓分二溫服未

發前服之取吐利

常山飲 治山嵐瘴面黃力劣寒熱往來心胃煩悶

常山

二兩 乾漆

炒煙出三兩

甘草

炙剉一兩

豉

生用一合

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心溫服

吐黃痰出効

豫固丸 治嶺南諸瘴

丹砂

雄黃

各一兩並水飛過令乾

鬼臼

半兩為末

阿魏

一分法酒半升熬成膏

右再研勻阿魏膏和丸如鷄頭大緋絹袋貯十九常執手中頻嗅瘴氣內行不着人遇瘴者并華水嚼下三九五服差

香椿散 治瘴氣惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食憎寒壯熱發過引飲二廣七閩多山嵐煙霧蛇虺齧

毒之氣當秋七八月之間芒華發時此疾大作謂之黃芒瘴又謂黃茅瘴是也蓋人或因饑飽或因虛怯或衝煙霧或涉溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟇瘴啞瘴其名不一並皆療之

香椿嫩

酒浸焙  
三兩

甘草

炙

南壁土

向日  
者

臘茶

各一  
兩

右為散每服二錢用酒調下如患久者更加甘遂柴胡各半兩空心臨卧服

煮豆丸 治嵐瘴

白朮

貫衆

去土

蒼朮

去皮

甘草

炙等分

右為末煉蜜丸如彈子大每一丸先用黑豆一盞銚子內鋪面令平於豆中心安藥丸添水高豆一指許慢火煮水乾取豆暴乾以絹袋盛豆每服二十粒新水下有瘴處空心一服如涉遠遇饑新水下五十粒至一百粒麤可充饑

炒桃仁

出余居士選奇方

治山嵐氣預辟瘴癘

桃仁

一斤

吳茱萸

青鹽

各四兩

右為一處鍋內炒候桃仁熟為度以瓷餅貯密封一  
七日後取出來茱萸并鹽只將桃仁去皮尖以新餅  
子盛時嚼一二十枚大辟山嵐毒氣一方每日空心  
服七粒爛嚼茶湯潤下或喫酒食前後一兩粒甚妙  
治山瘴瘧乍寒乍熱乍有乍無出聖惠方

鯪鯉甲

十四枚  
微炙

鼈甲

一兩塗醋炙  
令黃去裙襴

柴胡

一兩  
去苗

恒山

二兩  
兩塗醋  
炙微黃

桃仁

一兩湯浸  
去皮尖

右細剉以酒三盞浸一宿發前稍稍煖飲之勿絕

鯪鯉甲酒

出聖惠方

治山瘴瘧南方山嶺瘴氣令人寒熱

發作無時萎黃腫滿四肢痺弱

鯪鯉甲

炙五枚

鼈甲

去裙襴醋炙黃

烏賊魚骨

去甲

附子

炮裂去皮臍各一分

常山

半兩一方無

右細剉以酒二升半漬一宿瘧發前稍稍服之勿絕

藥味兼以酒塗身體服藥良久方可進食

常山酒

常山苗

一握無苗取根五兩代之

獨顆蒜

七顆

淡竹葉

二握一合裏

鼈甲

三兩  
炙

右切以苦酒三升煎取一升臨發隨性多少服盡之服訖當大吐愈忌食莧生葱生菜

山瘴癘酒

出鮑  
氏方

療乍寒乍熱乍有乍無及勞瘧痰滯

發渴不定久不瘥

常山

三兩

鼈甲

炙

升麻

烏賊魚骨

去  
甲

附子

各一  
兩

右並切絹袋盛以酒六升漬之少令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌猪肉生葱生菜

治山瘴瘧發作寒熱方

出聖惠方

恒山

三兩

烏梅肉

三七枝

飢帶

三寸

獨顆蒜

一枝

右以酒二大盞煮取一盞分為二服初一服未發前服之後一服臨欲發服之如其形候欲似不發即止方便安卧頭左側安為佳也

饅角飲子

出聖惠方

治山瘴瘧

米饅角

半兩九月九日者

寒食飯

二百粒

恒山

一兩剉

豉

一百粒

獨顆蒜

一枝

右以清水二大盞浸一宿至五更初煎至一盞去滓  
空腹頓服當下利為度

保安湯 治山嵐瘴癘寒熱久不差

常山

半兩

青蒿

知母

各一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁研半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生姜半分同煎至六分  
去粗稍熱服不拘時

大黃湯 治患瘴熱實兼吐痢者

大黃 常山 升麻 甘草

炙各三兩

右切以水七升煮取二升半分三服發前盡服別出  
吐痢忌海藻粉菜生葱生菜

觀音丸

出直指方

治夏暑毒瘴毒

圓白半夏生 烏梅肉 母丁香

川巴豆

不去油每件  
各十枚燂

右為末姜汁麴糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼去油  
又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角  
遇白衣人授之

常山散 治山瘴瘧

常山

分八橘皮

分六牡蠣

分四

桂心

分二

右為散發日平旦酒服一匕臨發一匕發後一匕二日不得洗手面七日忌食雜物唯藥用酒得餘皆斷或吐或不吐皆差忌生葱生菜

常山丸

出肘後方

治瘴瘧兼痢不止

常山 黃連

豉

各二兩

附子

二兩焙

右搗篩蜜為丸空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥

服至過發時勿喫食若兼諸痢者黃連犀角各三兩  
牡蠣香豉各二兩並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十  
丸再服飲下

砒霜丸 治嵐瘴寒瘧兼解邪毒

砒霜 澱花二雨鐵砧上末四雨  
淘淨

右為細末用麝香少許金銀箔四十片以糯米粽子  
丸如鷄頭大每服一九用酒磨下或吐或瀉為差

草豆蔻散

出十便  
良方

治山嵐瘴毒氣令不着人

草豆蔻

去皮

高良薑

甘草

炙各半兩

右麤搗篩每服五錢煎作熟水頻飲之

破塊丸 治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之効

單撥

一兩

大黃

一兩各生用

右為末入生麝香少許煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心冷酒下或溫冷湯下日三服

磁石丸

治瘴收陰

以磁石三兩煨醋淬一七遍為末醋煮麴糊丸如

梧桐子大每服三十九新汲水嚥下臨卧一服

丹砂散 治瘴正陽

以丹砂三兩水飛研細每服半錢溫密水調下平旦一服

檳榔湯 治瘴解蘊

以檳榔三兩生剉每服二錢水一盞煎至七分日午一服凡九服此藥隔夜先服磁石九次日一服丹砂散當日午服檳榔湯再夜再依此次第服之

三日後病勢減藥減半病勢盡藥即止

常山飲

一名七聖散出傳信通用方

治山嵐瘴癘寒熱往來或二

日一發或三日一發悉治之

常山劉厚朴

去籠皮生薑自然汁炙熱各一兩

草豆蔻皮去

肉豆蔻

去殼各一枚

烏梅

和核七枚

檳榔

劉甘草

炙各半兩

右麤搗篩每服二錢水一盞煎六分去滓候冷未發

前服如熱喫即吐

大正氣散

出三因方

治山嵐瘴氣發作寒熱遂成瘧疾

附子

炮去  
尖臍

厚朴

姜汁  
製

桂心

甘草

炙

乾姜

炮

陳皮

各一  
兩

茱萸

半兩  
微炒

右剉為麤散每服二大錢用水一盞半入生姜五片  
紅棗二枚同煎至七分去滓熱服不拘時候兼治霍  
亂吐瀉并一切氣疾一方為細末同前煎服

大効人參散

出經驗  
良方

治山嵐瘴癘不以久近或寒或

熱或寒熱相兼或連日間日或三四日一發並皆治  
之

人參

去蘆頭

常山

剉

青蒿

去根梗各等分

右為細末每服二錢半如明日當發今日午時用酒大盞調分作三服一更盡時一服三更一服五更一服

丹砂丸 治療瘧瘴癘

硃砂

光明者

牛膝

常山

各等分

右為末蜜和丸如梧桐子大候瘧發日平明日七丸飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差

忌生葱生菜生血物油膩牛肉等

恒山丸

出聖惠方

治山瘴瘧

恒山

一兩

桃仁

六十枝湯浸去皮尖雙仁別搗如灰

豉

一合炒乾

右為末以雞子白生用和丸如梧桐子大空腹以桃符湯下二十九丸欲發時又服三十九丸便差

常山酒 療瘴瘧及瘴氣

常山

三兩七細切蒜辦

右搗碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒小一升

半漬浸一宿旦去滓煖服盡須臾當吐為妙適令盡

好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生葱

生菜生冷肉麵油膩若早發者半夜服要冷吐

地龍飲

出危氏方

治瘴瘧諸瘧大躁煩熱

生地龍

二条  
研細

右入生姜汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱

熾加腦子少許

附子湯

出危氏方

治瘴瘧經久不差正氣羸弱身熱而火

極熱連日方醒發時沉着枕簟不能擡身戰掉不堪  
便弱飲食不進

附子

二枚一枚生去皮臍一枚  
炮去皮臍鹽水各一兩

右剉散每服三錢水盞半姜七片紅棗七枚煎七分  
去粗攤冷就吞靈砂丹五十粒或百粒未効再以十  
棗湯吞黃茅丹二十九仍服黑錫丹以墜痰一可回  
元氣凡有此瘡但當守續真元補虛弱為法

治山瘡瘡不相染除毒氣方

出聖  
惠方

以生葛根不限多少搗絞取汁極量飲之去熱毒  
氣自然而差

蜀漆丸 療瘴瘧不瘥

蜀漆 青木香 升麻 鼈甲炙 牡蠣 硃砂研

猪苓 香豉各四兩 常山 大黃各八兩

右搗篩為末蜜丸如梧桐子大米湯下十二丸日二  
服漸差至平服止忌食葷菜油膩生葱生血等物

木香丸 治諸瘴癘及蟲毒瘡等

木香

一分生

升麻

三分

鼈甲

去裙襴 醋炙黃

甘草

炙各半兩

玄參

猪苓

去黑皮 各三分

犀角

鎔

檳榔

判各半兩

鼓

炒一合

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心服

溫酒下日三服

常山飲 治一切瘴癘

常山

秦艽

去苗

甘草

炙判

麻黃

去根節

烏頭

炮去皮 剉判

杏仁

去皮尖雙仁炒研

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙各半兩

乾姜

炮半兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半生姜半分棗二枚  
擘破煎至一盞去滓未發前不拘時溫服

砒霜丸 治山嵐瘴癘或入山早吸毒氣令人寒熱如

瘧終日不已頭疼痰逆嘔吐不下食日漸羸瘦

砒霜 雄黃 丹砂 璚瑁鎔 藜蘆炒

椿葉陰乾者 阿魏一兩半  
各一兩 別研

右為末和均用安息香一兩酒浸重湯煮為糊丸如  
赤小豆大每用三丸男左女右以緋絹帶盛繫於臂

或衣帶上如瘡不已即用醋湯面東嚙下三九如要吐空心漿水下五九如吐甚以冷水調菴豆末一二錢服即止忌熱物此藥五月五日合勿令婦人雞犬見

麻黃散 療瘡癰

麻黃

去節

杏仁

去皮尖熬

甘草

炙

人參

鼈甲

各二兩炙

右為細末每平旦空腹溫酒三合服方寸匕日再宜七日連服服後七日不得食雜物并生蔥生菜菹

菜海藻松菜等物此方常服兼補虛羸

赤小豆丸

出聖惠方

治山嵐瘴癘

赤小豆

鬼臼

鬼箭羽

丹砂

研

阿魏

研各半兩

右先搗研五味為末酒煎阿魏和丸如梧桐子大每一服丸用緋絹帛子繫中指上男左女右嗅之如末差即以井華水服一九

白蜜丸

出聖惠方

療瘧瘴癘

取五六歲兒小便一升內白蜜二匙攪使相得去

白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不得吐  
但數小便亦佳不然終不除瘴氣及治諸瘡無間  
新久煮三沸頓服之

治山瘴瘡不相染除毒氣方

出聖惠方

以香豉一合水一大盞煎至半盞去滓溫服

荷葉散 治山嵐瘴氣痰滯嘔逆時發寒熱

乾荷葉

大者一片 砒霜

研一分

菴豆

半兩

甘草

一分炙

右為細末水調服之

冷湯

出廣南  
衛生方

治瘴毒內寒外熱咽嗑間煩躁不解

甘草

三寸炙黃  
為細末

人參

半兩  
為末

黑附子

去皮臍研  
末半錢

淡竹葉

十四片

大棗

五枚

右以水半升煎十餘沸放溫時時少少細嚼

樂令黃耆湯

出廣南  
衛生方

治嶺南瘴毒發熱發寒少熱多

煩躁引飲大便不通小便赤澀或狂言內熱神昏不

省

黃耆

洗炙

人參

洗炙

橘皮

湯浸去白

當歸

洗炙

桂心

剉去無  
味者

細辛去葉 前胡洗 白芍藥去皮 甘草炙 白茯苓

麥門冬去心 半夏洗湯

右等分為麤末每服三錢水一盞入生姜三片棗子二枚同煎至七分去滓溫服無時

薑附湯出廣南衛生方

治瘴毒陰候發熱或寒煩躁手足冷

鼻尖涼身體疼重舌上苔生引飲煩渴或自利嘔逆或汗出惡風方

黑附子生去皮臍每箇分作四分細切每分用水

一盞半入炮者乾姜二錢切作片子同煎至八分

一盞去滓溫服再煎無時

附子理中湯

出廣南  
衛生方

治瘴毒內寒自利煩渴手足厥

冷發熱燥悶嘔逆悶亂

黑附子

炮去  
皮臍

白朮

人參

乾姜

炮

甘草

炙

右等分為末每服三錢水一盞半煎至八分一盞去

滓溫服無時

香朴飲子

出廣南  
衛生方

止寒熱瘴

常山

酒浸一宿

地榆

洗

檳榔

橘皮

湯浸去白焙

厚朴

姜製

草菓子

和皮

右等分為末每服二大錢水酒共一盞煎至七分去

滓溫服

木香飲子

出廣南衛生方

止發熱瘴

未發前連喫三服

常山

酒浸一宿

甘草

炙

茴香

炒

檳榔

木香

右等分為末每服二大錢水一盞煎至七分去滓溫

服無時未發前連喫三服効

不換金散

出廣南  
衛生方

治寒熱瘴

蒼朮

米泔浸  
一宿

厚朴

去麁皮  
姜製

半夏

湯浸七遍各一兩姜二兩同  
搗爛焙乾入臼中杵不黑

藿香葉

去根洗  
焙

陳橘皮

湯浸去  
白焙

甘草

炙各  
一兩

右搗羅為末每服二錢水一盞半生姜三片同煎至

七分去滓溫服不拘時

五苓散

出廣南  
衛生方

澤瀉

剉二兩半

茯苓

去皮各一兩半

白朮

去蘆頭一兩半

桂

去麁皮一兩

猪苓

右為末每服二錢熱湯調下不計時候

黃耆建中湯

出廣南  
衛生方

黃耆

去蘆頭  
一兩

桂

去麤皮  
一兩

甘草

炙剉六  
分半

白芍藥

三兩洗  
去皮炒

右為麤散每服三錢水一盞入生姜三四片大棗一  
枚同煎至一中盞濾去滓入錫少許再煎令融稍熱

服空心食前

大養脾丸

出廣南  
衛生方

乾姜

炮二  
兩

縮砂

去皮  
二兩

茯苓

去皮  
一兩

甘草

剉炙一  
兩半

大麥蘖

炒一兩

人參

去蘆頭一兩

白朮

半兩

右為細末煉蜜和丸每兩作八九每服一九細嚼生

姜湯下食前

治丈夫婦人患熱瘴心中煩悶炮躁飲水不已昏迷至

危者一服立効

生地黃根生薄荷葉不以多少淨洗砂鉢內搗爛  
取自然汁入麝香少許用新井華水調下如覺心  
間頓涼不煩須再服

療瘴氣入腎中變寒熱心躁肺弱

黃連末 生枯樓 地黃 羊乳

右等分和黃連末任多少為丸用米飲服三二十丸  
無羊乳牛乳亦可此方無患亦宜食後臨卧常服至  
妙

厚朴散 理山嵐氣脾胃痰毒常宜服此方

好厚朴

一斤半去皮秤以生薑一斤半取汁塗炙盡為度

半夏

一斤湯洗過以粟米炒黃

右為散每服二錢水一盞入姜棗煎去滓早晚各一服

硃砂丸 治辟山嵐氣安心臟

硃砂

半兩顆塊者為上乳鉢內研飛過

人參

茯苓

各一兩

阿魏

一分米醋浸令半日以軟為度

吳白朮

米泔浸一宿以竹刀切焙乾搗羅為末

蜀當歸

各半兩切焙乾杵末以阿魏并醋同研入

右並須好者同阿魏及蒸餅和研熟得所方丸梧桐子大空心溫酒下七丸先嚼碎如有患者令早晨空

心桃仁湯下五九嚼下碎不過三度効

攻寒湯 復陽氣逐寒邪辟瘴疫

高良薑

桂心

各一兩

甘草

三兩

右將薑桂碎剉以青油半兩煎不住攪候焦褐色取出旋放冷三味同為末空心沸湯入鹽點服

厚朴湯 健脾胃散風濕止惡心腹痛山嵐瘴氣

厚朴

四兩製了者

甘草

六兩

乾姜

二兩

陳皮

二兩

右四件並麤剉以井華水洗二十一度以水五升煮

乾入桂末三兩炒鹽五兩為末不拘時以沸湯點調服

仙朮湯 辟山嵐瘴氣及晨朝暮夜觸冒寒邪

蒼朮

九兩

棗

四枚

乾姜

半兩

杏仁

一兩半

甘草

二兩

鹽

六分

兩

右為細末每一沸湯點一二錢服不拘時以上湯味非惟悅口神亦能祛疾防患誠為益

如神鼈甲湯 治一切瘴癘久患瘡

鼈甲

好醋炙透

去裙襖

常山

烏梅肉

桂心

柴胡

去苗知母各一兩

牡蠣

半兩炮燒

右為麤末每服二錢水二盞煎至八分去滓發前一服已發一服

柴胡飲子

治嵐瘴

柴胡

常山

青蒿

甘草

秦艽

人參

茯苓

枳殼

炒

半夏

湯盪七遍

右各等分焙乾為麤末每服二錢用水一盞半烏梅三枚生薑五片煎取一盞去滓食後溫服逐日一服

極妙切忌空心不得行路須是湯水白粥之類點心  
酒色不可大過忌四五月一過至八九十月一過不  
得喫柑子紫菜猪羊心并牛肉定被瘴

沃雪湯 治山嵐瘴氣

蒼朮

炒去  
麤皮

甘草

鹽擦炙  
各二兩

防風

細切

白芍藥

去  
皮

厚朴

用生姜壓一宿然  
後炒黑色為度

乾葛

各四  
兩

朴硝

一兩  
半研

右為剉散每四大錢水二盞煎至一盞半去滓熱服  
不拘時候服畢少時薑蔥作羹或作粥喫了避風坐

卧身體淑潤即愈兩滓又合煎服

必効散 治山嵐瘴癘

青橘皮去白 陳橘皮去白 常山 神麴 麥芽

地龍去土 檳榔 菰蔞 甘草炙 秦艽各等分

右為細末每服三大錢水一盞煎至七分通口服忌  
生冷醃膩猪犬魚腥羊肉

半夏草菓散 治嵐瘴及一切瘧疾

半夏

七斤湯炮七遍每遍百沸候湯冷用手握去滑

全青橘皮十四 棗子

五枚

烏梅

五枚

草菓子

二枚

生姜

二塊

草大

甘草

二寸

炙黃

右並洗淨爛搥碎同入砂瓶內用水一大碗以濕紙蓋頭及嘴以文武火煮至一盞去滓通口服之又將滓再依前作一服煎更作一料作兩服煎

草菓七棗湯

出朱氏集驗方

治瘴瘧

草菓

常山

貝母

鷄心檳榔

大棗

甘草

烏梅

右七味等分青蒿倍之每服四錢用水一盞半煎至

七分通口服再煎其効如神

七棗湯

出廣南衛生方

治老人虛人發熱或寒熱瘧

方見本門瘧瘧

類

治天行瘧瘧寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫

出本草

以草犀根煮汁服之

治瘧瘧

出本草

取鹽麩子乾搗為末食嶺南人將以防瘧

治瘧瘧寒熱邪氣泄痢陰氣不足及止渴

以小豆花於豉中煮五味調和作羹食之

治瘡瘡

出本  
草

取海鷄魚燒令黑末服二錢

此魚似鷄有肉翅能  
飛上石頭一名石礪

一名邵陽  
魚生東海

治勞熱瘡瘡

出本  
草

用土紅山葉搗爛酒漬服之

治瘡瘡渾身熱連背項

出本  
草

以茴香子搗汁服之

治勞瘴甚佳

出本  
草

用土紅山根如葛頭者薄切用米泔浸二宿更用清水浸一宿取出切炒令黃色搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服

治辟瘴

出本  
草

以菝葜根浸赤汁以煮粉噉之即金剛根也

治瘴瘧寒熱

出本  
草

以果然肉煮食之亦坐其皮為褥

治天行瘴癘疫毒

出本  
草

以百丈青煮服亦搗絞汁服

治久瘴癘寒熱無時者

出本  
草

以死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服

七物升麻丸

出本  
草

治瘴

升麻

犀角

黃芩

朴硝

梔子

大黃

各二  
兩

豉

二升  
微熟

右同搗散蜜丸覺四肢大熱大便秘難即服三十九取

利為止四肢小熱於食上服二十九非但辟瘴兼甚  
明目

治瘴瘧

以千里茛煮不拘時少服之吐下

萬靈丸 治瘴瘧

用川常山好者一兩為細末以水兩碗沙糖一塊  
如小胡桃大白沙蜜一匙令同於砂石器內慢火  
熬令水盡候冷丸彈子大每服一九於晝發日五

更時先用湯熱洗漱着鞋襪了方細嚼用溫酒半  
盞送下忌三日魚肉生冷糟腥葷味菜蔬只喫淡  
粥飯三日仍忌三日不得動冷物水神効

痺瘡

附論

夫痺瘡者由肺系有熱氣盛於身厥逆上衝氣實而不  
能外泄因所用力腠理開舒風寒含於皮膚之內分肉  
之間而發也發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣  
不及之陰故但熱而不寒邪氣內藏於心而外含於分肉

令人消鑠脫肉故名曰痺瘡其狀熱而不寒陰氣孤絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔也

方

茵陳蒿湯

出聖濟總錄

治瘴癘發作有時但熱不寒頭

痛不安通身俱黑大腸秘熱小便黃赤宜服此方

茵陳蒿

山梔子

去皮

柴胡

去苗

黃芩

去黑心

桔梗

炒

牡丹皮

去心

貝母

去心

荊芥穗

去梗

升麻

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

半夏

湯浸七遍去滑切焙

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

麻黃

去根節煎去沫焙各半兩

細辛

去苗葉一分

右細搗篩每服三錢水一盞半生薑二片煎一沸急

瀉出臨發熱頭痛時去滓熱服仍須時候但此瘧發

熱并初發時先壯熱者可服熱多寒少食後喫此藥

清脾湯

出醫方集成

治瘴瘧脉未弦數但熱不寒或熱多

寒少膈滿能食口苦舌乾心煩渴飲水小便黃赤大

腑結燥

青皮

去白厚朴

薑製炒

白朮

草薢仁

柴胡

去蘆

茯苓

去皮

半夏

湯炮七次

黃芩

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片棗一枚煎至七

分去滓溫服不拘時候一方加人參忌生冷油膩

香豉飲

出聖惠方

治痺瘡但熱不寒嘔逆不下食

豉

半合

葱白

七寸切

常山

三分

升麻

一兩

鼈甲

醋炙令黃去裙襴

知母

焙

生地黃

各一兩半

檳榔

煨三錢

右判如麻豆大每以一錢水三盞於星月浸一宿橫

刀一口安在藥上早晨煎取一盞半去滓空腹分為

二服重者不過兩服

大青飲

出聖濟  
總錄

治瘴癘積熱痰盛寒少熱多但熱不

寒煩躁引飲

大青

一兩莖葉紫者是不紫者即是遠志  
不可用也如無真者以青黛代之

大黃

醋炒

赤芍藥

常山

細剉  
炒

甘草

炙

龍膽

去土各  
半兩

右麤搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫

服氣盛熱多宜服得利或熱稍退即止人宿有冷痰

疾年四十以上者熱証不宜多服

茵陳枳殼湯

出聖濟  
總錄

治瘴瘧上焦熱身重目黃

茵陳蒿

取葉

枳殼

去瓢麩炒  
各一兩

桔梗

剉炒  
三錢

大黃

剉微  
炒

甘草

炙令黃  
各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不

計時候

硃砂丸

出聖  
惠方

治瘴瘧發作不定但熱不寒

硃砂

砒霜

馬牙硝

獼猴頭骨

末各  
一分

麝香

一錢

右相和研令勻醋煮麵糊和丸如茱豆大於發時前

以冷生薑茶下二九忌食熱物

白虎加桂湯

出千金方

治痺瘧陰氣孤絕陽氣獨發脉微

其候少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外含於分肉之間令人消爍脫肉者

石膏

碎一兩六錢

知母

六錢

甘草

炙二錢

粳米

半合

右除梗米外㕮咀拌勻以水一升煮藥五錢以米爛為度去滓加桂末三錢煎取四合作一服覆令汗先寒發熱汗出立愈

常山散

出聖惠方

治痺瘡發熱不止及間日瘡發作無時

常山

劉一兩

升麻

三分

鼈甲

去裙襴劉生用

山梔子

各半兩

右為散每服三錢未發前用溫水調下取吐即瘥

常山飲

出聖濟總錄

治痺瘡但熱不寒煩渴不止

常山

劉炒半兩

甘草

劉炒一分

烏梅

七枚槌碎去核培

青蒿

培一分

右麤篩都以小便一盞水一盞煎至一盞去滓當發

日空心服

恒山飲子

出聖惠方

治痺瘡但熱不寒嘔逆不下食

恒山

甘草

生用

地骨皮

各一分

生鐵一斤

打碎如  
碁子大

右細剉以水二大盞於星月下浸一宿橫刀一口安在藥上早晨煎取一盞去滓空腹分為二服重者不過兩劑差

治痺癰發時大渴寒熱不定

砒霜

半兩  
細研

菉豆

半兩

川大黃

一兩剉  
碎微炒

右為末入研了藥令勻鍊蜜和丸如梧桐子大露一宿夜發日平旦以冷水下一丸臨發前再服一丸忌

食熱物

十棗湯

出楊氏家藏方

治但熱不寒

穿山甲

用一兩

乾棗

十枚

右同燒成灰留存性研細末每服二錢當發日未出時用新井華水調服之

又方

出聖惠方

砒霜

一分細研

甘草

半兩

右研令勻以粟米飯和丸如菉豆大每未發時及空

心以井華水調下服之三九忌食熱物

香薷散

出醫方集成

治但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發少

氣煩冤手足熱而欲嘔兼渴

方見傷暑門

一方加黃連每料二兩名黃連香薷散治暑瘧獨熱燥

煩大渴引飲小便不利或背寒面垢每服加燈心二

十莖麥門冬去心二十粒淡竹葉七片車前草二根

晚耒根一握檳榔一枚切片煎不拘時候

一方治脾寒初服黃連香薷飲加檳榔不止服甘草飲

加檳榔服之止

鬼哭散

出經驗良方

治痺瘡但熱不寒

用黃丹煨煉過臨發蜜湯調下稍大能飲酒用酒

調下

大柴胡湯

出續易簡方

治痺瘡但熱不寒而嘔大便秘澀

間日瘡

附論

夫間日瘡者此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣內搏於五臟則道遠氣深故其氣行

遲不能與衛氣皆出是以間兩三日而作也

方

烏梅丸

出聖惠方

治間日瘧寒熱不止

烏梅肉

一兩微炒

桃仁

三十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

地骨皮

豉心

炒乾各一兩

虎頭骨

一兩半塗酥炙令黃

知母

鼈甲

塗醋炙令黃

川升麻

人參

去蘆頭各一兩

天靈蓋

一兩半塗酥炙令黃

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大空腹以

漿水下二十九晚再服

雄黃丸

出聖惠方

治間日瘧每日發者

雄黃

一兩  
細研

臘月野狐肝

二兩

阿魏

一分

硃砂

半兩  
細研

猢猻頭骨

一兩

天靈蓋

半兩

麝香

一分  
研

右為末入研藥末令勻於五月五日午時煉蜜和丸

如紅豆大每發時前男左女右以緋帛繫一九於中

指上時時嗅之後更以醋湯下一丸

糯米煮散

一名石膏

治間日瘧

方見本門  
瘧瘧類

常山湯

一名常山酒

治間日瘧先寒戰後壯熱

方見本門痰瘧類

神聖九

出聖濟總錄

治間日瘧

黑豆

小者二十一粒水浸去皮

砒霜

研一分

大棗

三枚煮去皮核

右須於重午七夕日修合同研丸如豌豆大以丹砂

為衣合時忌婦人雞犬見於發日早晨將藥一九面

北香上度過用冷茶清送下忌熱物服時

治瘧或間日發或夜發者

出聖惠方

恒山竹葉

各三兩

秫米

一百粒

石膏

右咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處  
橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器煖火煎取  
三升分三服清旦一服未發前候一食頃一服臨發一  
服三服訖靜室中卧莫共人語當日勿洗手面及嗽  
口勿進食取過時不發乃澡洗進食并用藥汁塗五  
心胷前頭面藥滓置頭邊或用烏梅二十七枚

常山酒

出聖濟  
總錄

治間瘧

常山一蒜

一獨頭者一顆  
兩去根莖橫切

糯米

黑豆

各一粒

右㕮咀以清酒一升病未發前浸藥於碗中以白紙覆之碗上橫一刀欲發時三分飲一分如未吐更服一分得吐則瘥

醇醕湯

一名大黃湯  
出聖濟總錄

治間日瘧及痰瘧積年不瘥者

大黃

剉炒  
三分

甘草

炙

常山

各一分半

右㕮咀以水三盞煎取一盞去滓更以水一盞煎滓取七分未發先服醕藥是後煎者相次服醇藥是前煎者瘥

又方

出聖  
惠方

小麥

合硫黃

一兩  
細研

右於臘日以醋浸四十九日取出焙乾每有患者取  
小麥七粒發前以冷醋湯下之

又方

出千  
金方

先以羊肉臙麵餅飽食之并進少酒隨其量飲如  
欣欣有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取大汗即瘥

又方

出千  
金方

燒黑牛尾頭毛作炭酒服方寸匕日三

又方

出聖惠方

治間日瘧

川大黃

半兩剉研微炒

甘草

一分炙微赤剉

恒山

三分桂心一分

右件藥都細剉以水二大盞煮取一盞去滓分為二服空心熱服臨發前再服

痰瘧

附論

痰瘧之狀胃中不利頭痛振寒怵慄而不能食食即嘔寒去則內外皆熱寒熱更作心下支滿痰積胃中氣逆

煩嘔故謂之痰瘧治痰瘧發作有時熱多寒少頭痛額  
角并胸前肌肉瞶動食纔入口即吐出面色帶赤也夫  
痰實瘧者謂患人胸膈先有停滯結實因感瘧病則令  
人心下支滿氣逆煩嘔也

方

常山甘草飲

出聖濟  
總錄

治痰瘧寒熱

常山

甘草

炙

大黃

剉炒各  
一兩

桑根白皮

剉一  
兩半

烏梅

五枚  
去核

杏仁

湯浸去皮尖  
雙仁炒十枚

黃連

去鬚  
一兩

羌活

去蘆頭  
一兩半

黃芩

去黑心半兩

芎藭

枳殼

去穰麴炒

赤茯苓

去黑皮各一兩

旋覆花

熬半兩

茈胡

去苗一兩半

附子

炒製去皮臍一兩

牽牛子

炒一兩半

桂

去麁皮

虎頭骨牙齒

酥炙黃一兩半

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服

細辛湯

出聖惠方

治痰癰吐隔

細辛

去苗葉

松蘿

犀角屑

甘草

各三分半

常山

升麻

各一分

梔子仁

玄參

各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服以吐  
病出為度其痰母爛鷄子是也一方用酒浸一宿去

滓溫服

蜀漆丸

出聖濟  
總錄

治痰逆多時久瘡不瘥及面黑四肢

黃腫

蜀漆葉

牡蠣

燒赤

黃芩

去黑心  
各一兩

大黃

生剉

甘草

炙剉

犀角屑

各三分

知母

焙半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫水

下

半夏散

出續易簡方

治痰癰發作有時熱多寒少如頭痛

額角并胸前肌肉潤動食纔入口即吐出面色帶赤

宜服此方

半夏

湯浸去滑為末生薑汁和作餅暴乾

藿香

去梗 羌活 去蘆頭

芍藥

各一分 牽牛 各半兩

右為細末每服三錢食後白湯調下以吐為度未吐

再服

石膏飲

出聖濟  
總錄

治一切痰瘧

石膏

碎

淡竹葉

各三兩

常山

甘草

生剉

烏梅

各二兩

粳米

半合一  
作糯米

右麤搗篩每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服吐

痰即瘥如熱盛加大黃一兩

烏頭湯

出聖濟  
總錄

治痰瘧吐不出

烏頭

炒製去  
皮臍

半夏

湯洗去  
滑焙

桂

去麤  
皮

芫花

醋炒

常山

各半兩

豉

炒一  
合

右判如麻豆每服三錢酒一盞煎至七分去滓發前  
溫服相次再服取吐為度

防葵飲

出聖濟  
總錄

治痰癰寒熱溫疫

防葵

鼈甲

醋炙去  
裙襴

松蘿

甘草

生各  
半兩

常山

三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓未發

前徐徐溫服

豉心丸

出聖  
惠方

治痰寒熱心膈煩壅不利

豉

微炒  
一合

大黃

生用  
兩半

常山

三分

升麻

半兩一  
作蜀漆

附子

小者炮裂  
去皮一枚

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七丸發前米  
飲下吐後更乾嚥七丸或加甘草半兩

二陳湯

出直指方

治傷食發癰痰多

陳皮 半夏

製各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩

右剉散每服三錢薑五片烏梅一枚煎服寒多者加  
草蓰熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意  
加減

蒜丹丸

出直指方

治截瘡消痰

號丹

煨

穿山甲

熬灰中炮焦各一兩

土硃

半兩

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏丸如梧桐子大每服  
十丸生薑烏梅紫蘇煎湯送下

胡粉丸

出聖濟總錄

治一切瘡及吐一切痰疾

胡粉

研

砒霜

研

寒水石

焙研各一兩

右合研勻滴水丸如鷄頭子大發前新汲水吞下一  
丸即大吐至日困睡為驗

常山酒

出聖  
惠方

治痰實瘧發渴不止久不瘥

常山

三分

烏梅肉

生用

甘草

生用

各半兩

右細剉以酒二盞浸一宿早晨去滓煎服一盞良久以筋入喉中引之吐痰即瘥一方用水生薑煎服

升麻常山湯

出聖  
惠方

治痰瘧發作無時寒熱不下食

升麻

一兩

常山

二兩

蜀漆葉

一兩

半兩

右麤搗篩每服四錢以井華水一盞半煎至一盞空心頭服瘥又即吐吐定食漿水粥和之

半夏丸

出危氏方

治瘧咳嗽痰盛痞滿煩悶咽膈不利嘔

吐惡心神思昏憤心忪面熱並皆治之

半夏

十六兩湯洗去滑薑汁淹一宿

白礬

八兩枯過

右為末生薑自然汁為丸梧桐子大每服三十九食

後臨卧淡薑湯吞下

治溫瘧痰盛寒熱

出聖惠方

常山

一兩

香豉

二合炒乾

右為末粟飯為丸如梧桐子大每服二十九熟水下

又方

出仁  
存方

青蒿

二兩

黃丹

半兩

右為末每服二錢寒多酒調熱多湯調青蒿以童子小便浸焙乾尤健

冷附湯

一名七  
葉湯

治瘧疾無過是痰實痞塞不通脾胃

弱虛熱在上停於胃膈不得入於臟腑所以五更冷

服乃使藥下達肚脾胃去痰實除虛熱降心氣屢用屢

効

方見本門  
痰瘧類

松蘿丸

出聖惠方

治痰實癰發渴不止

松蘿

常山

剉各半兩

阿魏

蜀漆

大青

硃砂

研

麝香

細研各一分

右為末研勻取端午日午時於淨室內用七家粽子尖和丸如梧桐子大當修合時不得婦人鷄犬見如發時以溫湯下五丸夜發時桃符湯下兼取緋帛三二寸繫五丸男左女右臂上疾愈即去之如再發時取臂上繫五丸服之

治痰實瘧久不瘥

出聖惠方

木香

一兩恒山

三分

松蘿

半兩

赤小豆

半合

砒霜

一分細研以醋五合煎令稠

右為末以砒霜煎和丸如梧桐子大空心以溫漿水下三九以吐為度如未定晚再服之

松蘿湯

出聖惠方

治痰實瘧每夜不定時節或朝或暮漸

不能食

松蘿

人參

去蘆頭

常山

川升麻

各半兩

竹葉

一百片

右為細剉以水二大盞煎取一盞去滓分為二服平旦時一服如人行五里當吐不吐更一服良久得吐即瘥

烏梅湯

出聖惠方

治痰實瘧盛攻作寒熱

烏梅肉

微炒

常山

各半兩

松蘿

三分

鼈甲

生用

川升麻

各一兩

右細剉以水三大盞煎取一盞半下茶末二錢更煎三兩沸去滓空腹分為二服如人行五里當吐如未吐再一服以吐惡痰為度

恒山散

出聖惠方

治痰實瘧發渴寒熱不定

恒山

半兩

硃砂

半兩

細研烏梅肉

半兩

生用

右細為散入硃砂研勻每於發前以醋湯下一盞以吐為度

治痰瘧

出本草

以生熟湯熬鹽投中飲之令吐出痰及宿食

痰瘧

附論

夫痰瘧者夏傷於暑其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡

風夏則多汗者然其搗作有時以瘡之始發先起於毫  
毛呻欠乃作寒慄鼓領腰脊疼痛寒去則內外皆熱頭  
痛如破渴欲飲冷者此乃陰陽上下交爭虛實更作陰  
陽相移也陽并陰則陰實陽虛陽明虛則寒慄鼓領巨  
陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝陽則骨寒而痛  
寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外  
皆熱則喘渴欲飲此得之夏傷於暑熱氣盛藏之於皮  
膚之內腸胃之外此榮氣之所舍則令汗出肉腠理開

因得秋汗出遇風乃得之及以浴水氣舍於皮膚之間  
與衛氣并居榮氣者晝行陽分此氣得陽則出得陰則內  
是以隔日作也痰瘧者以瘧發該時或間日廼作也入  
衛氣流行合於晝夜陰陽邪氣內舍於榮隨衛氣以出  
入而應於風府其作早晏皆以時發也寒溫瘧瘧動皆  
該時故內經統謂之痰瘧

方

虎頭骨丸

出聖惠方

治痰瘧久不瘥

虎頭骨

二兩 塗醋 炙微黃

硃砂

半兩 細研

恒山

半兩 剉

甘草

一兩半 生剉

牡蠣

二兩 微炒

桂心

一兩 剉

知母

二兩

香豉

一兩 炒乾

烏梅

二兩 附子

一兩 炮裂 去皮臍

枳殼

半兩 麩炒 微黃 去穢

木香

一兩

川大黃

二兩 剉 微炒

桃仁

三七枚 雙仁 去皮尖 皆湯浸去麩炒微黃

右為末研入硃砂令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每於發前以桃符湯下十丸

知母飲子

出聖 惠方

治痰癰積年不瘥者

知母

半兩 塗醋 炙令 黃去 裙攔

恒山

剉各 一兩

烏梅肉

七枚 微炒

豉心

粒一百

粳米

粒一百

甘草

炙微赤剉

川大黃

各半兩

右細剉和勻每服半兩以童子小便一中盞浸一宿五更初煎至六分去滓溫服臨發前再服以利為度每日發與不發皆得服之待過發後即得喫食

恒山丸

一名麻黃丸一名祛邪丸

出千金方

治痰瘧

恒山

知母

甘草

大黃

各十八銖

麻黃

一兩

右為末蜜和丸如梧桐子大未食服五丸日二不知漸增以瘥為度肘後無大黃面東清水下祛邪丸

治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之衛州書云瘧寒多熱少痰多也然寒多熱少而脉浮則痰無疑矣可吐之若脉遲微者惡寒瘧耳宜柴胡桂薑也

鼈甲清酒

出千金方

治瘧瘧以時發

鼈甲

醋炙半兩

烏賊魚骨

去甲

常山

各二兩

附子

炮裂去皮臍

甘草

剉各一兩

右剉如麻豆大每服五錢以酒一盞半清藥一宿明日以酒先塗五心過發時瘧斷若不斷可飲藥酒一

二蓋即瘥

烏梅丸

出聖惠方

治瘕瘕或發或歇久不瘥

烏梅肉

二十七枚

恒山

三兩末

香豉

二兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁四十九枚

右搗如泥以少許蜜和搗二三百杵丸梧桐子大每服以粥飲下三十丸日三服

常山酒

出聖濟總錄

治瘕瘕先寒戰動寒解壯熱日發及

間日發

常山

淡竹葉

切洗一兩

鼈甲

去裙襴酥炙一分

甘草

炙判三分

右麤搗篩每服五錢以酒半盞浸藥覆安露地一宿  
明旦以水一盞煎至七分去滓未發前溫服盡當吐  
既効不必盡劑過發時良久方可食

霜墨丸

出聖濟總錄

治痰瘧

砒霜

錢一

蓴草灰

各五分

萊豆粉

一分

右一處細研為末用糯米粥和丸如小豆大每服兩  
丸未發前一時辰醋湯下端午日未出時面東修合

不得言語勿令婦人鷄犬見

丹砂丸

一名硃砂丸

治痰瘡寒瘡溫瘡痺瘡悉治之

方見本門

諸瘡類

振虎膏

出聖濟總錄

治痰瘡

胭脂

阿魏

各一大豆許同研

右同研以大蒜肉研和為膏用桃大核一枚劈開去仁取一片以藥膏子填在核瘡發時用藥挑核覆在手虎口上男左女右令藥着肉以緋帛繫定經宿

七棗湯

一名冷附散  
出醫方大成

治五臟氣虛陰陽相勝作痰瘧

不問寒熱先後與夫獨作疊作間日及痰痞塞不通  
發作無時或寒多熱少或單寒者悉治之

附子

一枚炮裂以鹽水泡再泡如此七次不浸去  
皮臍一方以水調陳壁土為糊泡浸七次

右咬咀分作二服水半盞生薑七片棗七枚煎至八  
分盞當發日去滓空心溫服川烏亦可一方名冷附  
湯去棗煎熟露一宿五更初冷服凡患瘧疾無過是  
痰實痞塞不通脾氣弱虛熱在上傳於胸膈不得入

於臟腑所以五更冷服乃使藥下達肚脾胃去痰實  
降虛熱降心氣屢試驗治瘧虛寒久不瘥者空心服仍  
食棗三枚一方以葱白七寸同煎

治瘧瘡及邪熱

用冬葵子陰乾為末服之午日取花接手赤去瘡

又方

出聖  
惠方

恒山

半兩  
剉

甘草

二兩  
生用

川大黃

半兩

桂心

半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至六分

去滓空心溫服欲發時再服



普濟方卷一百九十九